

水稲・大豆害虫発生状況速報

平成30年8月1日発行

○フェロモントラップ・すくい取りによるカメムシ発生状況調査結果

単位:頭

調査地点	調査月日	本田内	本田畦畔
		フェロモントラップ	すくい取り
光珠内中央	8月1日	15	2
光北下中ノ沢	8月1日	2	4
光珠内北(山側)	8月1日	15	0
峰樺	8月1日	11	3
豊葦	8月1日	8	0
岩峰	8月1日	6	0
中小屋	8月1日	6	1
上美唄	8月1日	21	0

現在、多くの圃場で開花期となっており、生育の早い圃場では着莢期となっております。莢が2mm以上となると被害を受ける可能性が高まりますので基幹防除を実施して下さい。

○フェロモントラップによる大豆マメシンクイガ調査結果

単位:頭

地域	品種	8月1日	8月8日	累計
光珠内北(山側)	ユキホマレ	56	36	92
峰樺	ツルムスメ	91	24	115
豊葦	ユキホマレ	77	26	103
岩峰	ユキホマレ	42	10	52
中小屋	ユキホマレ	74	10	84
上美唄	ユキホマレ	412	48	460
合計		752	154	906
平均		125.3	25.7	151.0
前年平均		131.5	120.8	—

※ 農業散布の際にはドリフトに充分ご注意下さい。また、現在、小麦の収穫が行われています。収穫物出荷の際には栽培履歴の提出をお願い致します。

JAみねのぶ 営農販売課

TEL 0126-67-2334 FAX 0126-67-2803

