

# 水稲・大豆害虫発生状況速報

令和元年8月2日

## ○フェロモントラップによるカメムシ発生状況調査結果

単位:頭

調査地点	調査月日	本田内
		フェロモントラップ
光珠内中央	8月1日	9
光北下中ノ沢	8月1日	2
光珠内北(山側)	8月1日	15
峰樺	8月1日	11
豊葦	8月1日	8
岩峰	8月1日	6
中小屋	8月1日	6
上美唄	8月1日	21

## ○フェロモントラップによる大豆マメシンクイガ調査結果

単位:頭

地域	品種	8月1日	8月8日	累計
光珠内北(山側)	ユキホマレ	63	-	63
峰樺	ツルムスメ	46	-	46
豊葦	ユキホマレ	59	-	59
岩峰	ユキホマレ	22	-	22
中小屋	ユキホマレ	73	-	73
上美唄	ユキホマレ	12	-	12
合計		275	0	275
平均		45.8	-	45.8
前年平均		139.2	120.8	-

現在、多くの圃場で開花期となっており、生育の早い圃場では着莢期となっております。莢が2mm以上となると被害を受ける可能性が高まりますので基幹防除を実施して下さい。

※ 農業散布の際にはドリフトに充分ご注意下さい。また、現在、小麦の収穫が行われています。収穫物出荷の際には栽培履歴の提出をお願い致します。

JAみねのぶ 営農販売課

TEL 0126-67-2334 FAX 0126-67-2803

