

作 況 情 報 (6月1日現在)

令和元年6月1日発行

○秋まき小麦 (きたほなみ)

地域名	栽培体系	草丈 cm	茎数 本/m ²	遅速	葉色 SPAD	生育期進度 (出穂期)	生育期進度 (開花期予想)
光珠内	慣 行	63.4	800	+8	48.0	5月27日	6月5日
豊 葦	慣 行	75.1	872	+8	49.6	5月27日	6月5日
岩 峰	慣 行	61.8	784	+4	45.9	5月31日	6月9日
光珠内	大豆間作	68.0	686	+6	53.0	5月29日	6月7日
上美唄	大豆間作	62.9	778	+1	55.6	6月3日	6月12日
平 年	慣 行	61.2	1,077	-	-	6月4日	6月13日

小麦の赤かび防除について

一部の生育の早い圃場では6月5日頃より開花が予想されます。圃場をよく観察し適期を逃さないように防除を実施しましょう。

○秋まき小麦赤かび病防除体系

回 数	薬 剤 名	使 用 倍 率	備 考
1回目 (選択)	リベロ水和剤	2,000倍	出穂揃から 7日間隔
	シルバキュアフロアブル	2,000倍	
2回目	トップジンM水和剤	1,000～1,500倍	
3回目	シルバキュアフロアブル	2,000倍	
	ベフラン液剤25※	1,000倍	
臨 機	チルト乳剤25※	2,000倍	

※リベロ水和剤・シルバキュアフロアブル・チルト乳剤25は同系剤ですので連用は避けて下さい。

○春まき小麦赤かび病防除体系

回 数	薬 剤 名	使 用 倍 率	備 考
1回目	リベロ水和剤	2,000倍	出穂
	シルバキュアフロアブル	2,000倍	
2回目	トップジンM水和剤	1,000～1,500倍	
3回目	シルバキュアフロアブル	2,000倍	
4回目	ベフラン液剤25	1,000倍	
臨 機	チルト乳剤25	2,000倍	

JAみねのぶ	営農販売課
TEL 0126-67-2334	FAX 0126-67-2803