

営農情報



第8号 令和3年4月30日
 JAみねのぶ営農販売課
 空知農業改良普及センター
 TEL:0126-67-2334
 FAX:0126-67-2803

もう一息！ 健苗に仕上げましょう！！

はいにゆうしょうじんき
 ～ 胚乳消尽期(2.5葉前後)の管理をていねいに ～

○ 育苗後半の管理

| 項目 | | 1.5葉～3.0葉 | 3.0葉～移植 |
|------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 管理目標 | | 苗の徒長防止 | 苗の充実馴化 |
| 管理要点 | | 温度に注意して十分に換気する | 外気温に十分馴らす 苗のしおれに注意しかん水する |
| 管理内容 | 温度管理 | 苗の葉先で20℃ | 苗の葉先で18～20℃ |
| | 換気目安 | 25℃以上や晴天日 | 外気温と同じに |
| | 温度調節(換気) | 晴天日は早朝から肩・裾換気し、夕方は早く閉じる | 降霜に注意し、昼夜とも肩・裾を解放する |
| | 水管理 | 各時期とも、日没までに蒸発するかん水量に止める | |
| | 目安 | 早朝葉先に水滴の付着が少なくなったとき 日中、葉身の展開が悪くなったとき | |
| | 方法 | かん水する場合は一度に行い、床土全体に浸透したことを確認 夕方の床土水分は翌朝かん水できる程度とする | |

【 管理の要点 】

- ・ 苗の異変は、朝露の乗り方で発見しましょう。部分的に乗らない時に注意！
 - ・ 2葉目が伸びる時期からかん水を控え、葉でなく根を伸ばしましょう。
 - ・ 中苗マットの追肥は1.5葉前後と2.5葉前後、かん水に合わせて行います。
 - ・ 2.5葉頃は胚乳の養分がなくなる時期で、障害への抵抗力が弱くなります。
- 「高温 ⇄ 低温」「過乾 ⇄ 過湿」「強冷風」など環境の変化に気をつけましょう。