

営 農 情 報

令和4年5月20日
第16号

水稻初中期一発剤の施用について

本年は例年に無く強い風が長期に渡り吹いており、水田の水が偏り易い状況となっています。また、水田内の水が濁っていることから水が落ち付いていないことで土壌処理剤（草笛フロアブル・ユニハーブフロアブル等）の除草効果が十分に発揮できないことが想定されます。そこで移植後の初中期一発剤散布については下記を参考に施用時期の選定を行いましょう。

『初中期一発剤施用は雑草発生状況をよく確認して薬剤選定・実施時期を決めましよう！』

○各雑草に有効な薬剤

薬 剤 名	薬剤形状				対象雑草と処理限界葉齢						備 考
	フロアブル	1kg粒	ジャンボ	豆粒	ノビエ	ウリカワ	エゾヤ	オモダカ	ホタルイ	ミスアオイ	
アップレZ	○	○	○		2.5葉	2葉	2葉	出芽時	2葉	1葉	SU剤につき褪色症状が発生する可能性有
エンペラー	○	○	○	○	2.5葉	2葉	2葉	出芽時	2葉	3葉	
ジャイロ	○	○			2葉	出芽時	2葉	出芽時	2葉	1葉	
ジャスタ	○	○	○		3葉	2葉	2葉	1葉	3葉	5葉	
ブルーガ	○	○		○	2.5葉	2葉	出芽時	出芽時	2葉	2葉	

※ご不明な点が御座いましたら営農販売課 奥山までご連絡願います。

J A み ね の ぶ 営 農 販 売 課
TEL 0126-67-2334 FAX 0126-67-2803